

Amezti galiziar-leondarra eta Iberiar Sistemako iparraldeko ameztia

2.4.2

Melojar galaico-leonés y del Sistema Ibérico septentrional



Serie onbrofiloek eragin atlantikoa izaten dute hainbat landare nemoraletan eta isasti eta txilardietako orpo-etapetan, mendirik euritsuenetan zabalduz. Kutsu ozeanikoko serieak Zamora eta Leongo mendilerroak eta Sistema Zentraleko mendebaleko mendilerroak, Frantzia Haitzetik, barne hartzen ditu. Serie kontinentala Mendigune Iberikoa barne hartzen du.

Las series ombrófilas acusan la influencia atlántica en algunas plantas nemorales y en sus etapas seriales de piornales y brezales, extendiéndose por las montañas más lluviosas. La serie de matiz oceánico comprende las sierras zamorano-leonesas y las sierras occidentales del Sistema Central desde Peña de Francia. La serie continental comprende el Macizo Ibérico.

355	<i>Quercus pyrenaica</i>	Ametza	Melojo, rebollo
127	<i>Cytisus scoparius</i>	Isatsa	Retama de escobas
118	<i>Crataegus monogyna</i>	Iparraldeko elorri zuria	Majuelo o espino albar
158	<i>Erica arborea</i>	Zurikatxa	Brezo blanco
253	<i>Lonicera periclymenum</i>	Basoetako atxaparra	Madreselva
213	<i>Ilex aquifolium</i>	Gorostia	Acebo
8	<i>Acer campestre</i>	Astigar arrunta	Arce menor
13	<i>Acer monspessulanum</i>	Eihar frantsesa	Arce de Montpellier
180	<i>Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia</i>	Lizar hostotxikia	Fresno de hoja pequeña
188	<i>Genista florida subsp. polygaliophylla</i>	Isats zuria	Retama blanca
23	<i>Adenocarpus complicatus</i>	Isatsa	Codeso
335	<i>Prunus spinosa</i>	Udareondo arantzatsua	Peral
109	<i>Corylus avellana</i>	Hurritza	Avellano
176	<i>Frangula alnus</i>	Zumalakarra	Arraclán
211	<i>Hedera helix</i>	Huntza	Hiedra