


Quejigar mesetario



Barrualdeko ameztietan oso flora gutxi dago eta abariztien eta miterdien lurralde-lehiaketa pairatzen dute. Hala ere, azalera zabalak hartzen dituzte Duero ibaiaren arroan, Alcarrian eta Mendi Unibertsaletan.

Amezti nagusi da ekialderanzko zuhaitz-errezelean, pinuekin batera sarritan, baina hegoalderantz, Alcarrian eta hegoaldeko Sistema Iberikoan artea da berarekin batera nagusi, eta horrela, zaila egiten da nolabaiteko azalerako amezti puruak aurkitzea.

Los quejigares del interior muestran una composición florística más pobre y sufren la competencia territorial de carrascales y sabinares, a pesar de lo cual ocupan extensiones importantes en la cuenca del Duero, la Alcarria y en los Montes Universales.

El quejigo domina el dosel arbóreo hacia oriente en muchas ocasiones acompañado de pinos, mientras hacia el sur, en la Alcarria y el Sistema ibérico meridional la encina se hace co-dominante hasta el punto de hacerse difícil encontrar quejigares puros de cierta extensión.

343	<i>Quercus faginea</i>	Erkametzta	Quejigo, roble carrasqueño
13	<i>Acer monspessulanum</i>	Eihar frantsesa	Arce de Montpellier
455	<i>Sorbus aria</i>	Hostazuria	Mostajo
215	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin horia	Jazmín silvestre
168	<i>Euonymus europaea</i>	Basaerramua	Boj montés
118	<i>Crataegus monogyna</i>	Iparraldeko elorri zuria	Majuelo o espino albar
238	<i>Ligustrum vulgare</i>	Abustu arrunta	Aligustre
391	<i>Rosa corymbifera</i>	Arkaratsa	Rosal candelabro
509	<i>Viburnum lantana</i>	Andura	Morrionera
248	<i>Lonicera etrusca</i>	Atxaparra	Madreselva etrusca
253	<i>Lonicera periclymenum</i>	Basoetako atxaparra	Madreselva
211	<i>Hedera helix</i>	Huntza	Hiedra