



Hemen zaude
Estás aquí

Bosques de ribera submediterráneos

Lizardi eta zumardiek, makal basoekin batera ibar submediterraneokoak zeharkatzen dituzten formazioak osatzen dituzte. Lizar hostotxikia (*Fraxinus angustifolia*) nagusi den basoak dira eta honekin batera zumar hostotxikia (*Ulmus minor*) eta makal beltza (*Populus nigra*) ageri ohi dira eta substratu azidoetan zenbaitetan haltza (*Alnus glutinosa*) ere agertzen da. Oihanpean sastrakadi hostogalkor ugari du, besteak beste; intsusa beltza (*Sambucus nigra*), zuhandorra (*Cornus sanguinea*) eta aihenzuria (*Clematis vitalba*) edo otsaihena bezalako lianak. Baso hauek onuragarriak dira ibilguen erregulaziorako.

Las fresnedas y olmedas, junto con las choperas, representan las formaciones que recorren las riberas submediterráneas ibéricas. Son bosques dominados por fresnos de hoja estrecha (*Fraxinus angustifolia*), acompañados de olmos (*Ulmus minor*) y chopos (*Populus nigra*), con la presencia puntual de algún aliso (*Alnus glutinosa*), que predomina sobre sustratos ácidos. Su sotobosque es rico en arbustos caducifolios como saúcos (*Sambucus nigra*), cornejos (*Cornus sanguinea*) y lianas como la clemátide (*Clematis vitalba*) o el lúpulo (*Humulus lupulus*). Estos bosques favorecen la regulación de los cauces.



Fraxinus angustifolia


Lizarraren loreak hostoak baino lehenago garatzen dira, haizearen bidezko polinizazioa errazteko asmoz.
Las flores del fresno se desarrollan antes que las hojas, para facilitar la polinización por el viento.



Ulmus minor

Grafiosiak, onddo batek sortu eta zenbait kakalardok hedatzen duten gaixotasunak, zumar populazioak asko murriztu ditu.

La grafiosis, enfermedad producida por un hongo y transmitida por algunos escarabajos, ha mermado las poblaciones de olmos.



Populus nigra




Fraxinus angustifolia



Ulmus minor



Populus nigra



Salix rubens