



Hemen zaude
Estás aquí

Bosques de roble y tilo

Gutxi dira Europa ipar-ekialdeko lautada errusiar hotzak jasateko gai diren zuhaitz hostoerorkor espezieak. Bertako basoak haritz arruntez (*Quercus robur*) eta Uraletan nagusi den ezki hosto-txikiz (*Tilia cordata*) osatuak daude, eta hauekin batera, zumar hostozabala (*Ulmus glabra*), zumar dilindaria (*Ulmus laevis*) eta astigar zorrotza (*Acer platanoides*) agertzen dira. Lizarra (*Fraxinus excelsior*) ibar-basoetara mugatzen da, lurzoru heze eta aberatsetara.

Muy pocas especies de árboles caducifolios alcanzan las frías llanuras rusas del nordeste de Europa. Sus bosques están dominados por el roble común (*Quercus robur*) y el tilo de hoja pequeña (*Tilia cordata*), que predomina en los Urales, acompañados por el olmo montano (*Ulmus glabra*), olmo blanco (*Ulmus laevis*) y arce real (*Acer platanoides*). El fresno (*Fraxinus excelsior*) se extiende restringido a los bosques de ribera, con suelos húmedos y ricos en nutrientes.



Tilia cordata



Kaukasoko biztanleek ezki azala enplastuetan erabiltzen zuten egin berri zeuden zauriak ixteko.
Los habitantes del Cáucaso empleaban la corteza del tilo en emplastos para cicatrizar heridas recientes.



Tilia cordata *Acer platanoides* *Quercus robur* *Ulmus glabra* *Carpinus betulus*