



SALUD Y RIESGOS AMBIENTALES

INDICADOR

PORCENTAJE DE FUMADORES

La incidencia del tabaco sobre la salud es uno de los principales riesgos ambientales a los que están sometidos los habitantes de una ciudad. El tabaquismo es sin duda uno de los hábitos sociales más extendidos y afecta de manera directa a una gran parte de población no fumadora.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE VITORIA-GASTEIZ 2010-2014

- 8.1- Reducir la incidencia de factores determinantes que afectan negativamente a la salud.
- 8.2- Fomentar hábitos y estilos de vida saludables entre la población.

DEFINICIÓN

El tabaquismo se analiza a través del porcentaje de fumadores, diferenciando entre la población escolar (de 14 a 18 años) y la población adulta. Se consideran "fumadores" tanto los que fuman habitualmente como los que lo hacen de manera ocasional.

ASPECTOS TÉCNICOS

Periodicidad: Bienal.

Unidades: Porcentaje.

Representación gráfica:

	2002	2003	2007
Población de 14 a 18 años	34,5 %	(*)	24%
Población mayor de 18 años	(*)	34,5 %	34,1%

(*) Sin datos, en espera de nuevas determinaciones

MÉTODO DE CÁLCULO

Los datos se obtiene a través de estudios periódicos sobre el hábito tabáquico en población escolar y en población adulta, realizados por el Departamento Municipal de Salud y Consumo (DEMSAC).